

ADHESOL®
RESINA DE COLOFONIA
ESENCIA DE TREMENTINA
ADHESIVO ANTISEPTICO

Venta Libre
Líquido de uso externo

Industria Argentina

FÓRMULA:

Cada 100 g contiene:

Resina de colofonia	37 g
Esencia de Trementina	0.5 g
Excipientes: Aceite de Ricino; Acetato de Amilo: Bicarbonato de sodio; Isopropanol; Hexano c.s.p.	100 g

ACCION TERAPEUTICA:

Adhesivo antiséptico

EFFECTOS SECUNDARIOS:

No se conocen.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

FORMA DE USO:

Limpiar la zona con un antiséptico adecuado previo a la realización del vendaje.
Extender una capa delgada de **ADHESOL** sobre la zona donde se va a fijar el mismo.
Esperar un minuto y aplicar la gasa o apósito.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso externo exclusivo. Evitar el contacto con los ojos. En caso de ingesta accidental consultar con un centro de toxicológico:

Hospital de Niños R. Gutiérrez (011) 4962-5666;

Hospital A. Posadas (011) 4658-7777.

PRESENTACIONES:

Envases con 30 y 92 ml.

Manténgalo alejado del alcance de los niños y, por su carácter inflamable, de cualquier fuente de calor. Debe permanecer tapado para evitar su evaporación.

Especialidad Medicinal autorizada por el:

Ministerio de Salud Certificado No 14.223

Dirección Técnica: Anabela M. Martínez . Farmacéutica.

Laboratorios: Calle 606 Dr. Dessy 351 (B1867DWE) Florencio Varela – Pcia. de Buenos Aires.

Última revisión: Octubre 1999

INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.

J.E. Uriburu 153 – C1027AAC Buenos Aires – Te: 4953-7215

INDICACIONES Y FORMA DE USO:

Protección de heridas:

A Aplicar **ADHESOL** pincelando con un hisopo una banda de 2 ó 3 cm a corta distancia de la herida y en todo el contorno de ésta.

B Colocar sobre la herida una gasa o compresa.

C Superponer una gasa que sobrepase los límites fijados con **ADHESOL**. Antes de colocar la gasa conviene esperar que la aplicación de **ADHESOL** se haya evaporado algo, pues de ese modo adherencia que se obtiene es mayor y más rápida.

D Comprimir suavemente con una torunda de algodón sobre la parte pincelada hasta que la gasa quede adherida a la piel.

E Recortar los bordes excedentes de gasa.

La remoción de las gasas o apósitos fijados con **ADHESOL** se hace ejerciendo una moderada tracción o empleando alcohol como solvente.

CAMPOS DE APLICACIÓN:***En Cirugía Programada o de Emergencia:***

Permite delimitar el campo quirúrgico sin producir irritación.

En la atención de accidentado y en el post-quirúrgico:

Ofrece notables ventajas para la fijación de gasas secas, apósitos y vendajes.

Por ser hipoalergénico y evitar que los pelos se pequen a la gasa, sustituye con amplias ventajas a la cinta adhesiva.