

INESPECIN®

Glucidolípidos de Salmonella Typhi

Comprimidos – Vía oral

Industria Argentina

Venta bajo receta

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA

Cada comprimido contiene:

Glucidolípidos de Salmonella typhi correspondientes a	20.000 millones
Povidona	4 mg
Estearato de Magnesio	1 mg
Almidón de maíz	12,67 mg
Lactosa c.s.p.	100 mg

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Inmunomodulador.

INDICACIONES

Profilaxis de procesos infecciosos por estimulación inespecífica de las defensas orgánicas.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Estudios realizados in-vivo en conejos y en humanos voluntarios, han demostrado un aumento de la concentración de properdina sérica y del complemento, a los 14 días, luego de la administración de INESPECIN. Estudios in-vitro, evidencian la capacidad de INESPECIN de activar células mononucleadas humanas provocando diferenciación y adquisición del fenotipo macrófago activado.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Adultos: 6 comprimidos, uno por día con un intervalo de descanso de 3 días entre el tercero y el cuarto.

Niños: 1 comprimido por día durante 2 días. Suspender tres días y luego repetir la toma de 1 comprimido por día durante 2 días.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. Niños menores de 1 año y enfermedades autoinmunes. Embarazo.

ADVERTENCIAS

Por tratarse de una medicación de origen biológico, consulte a su médico en caso de presentarse reacciones de hipersensibilidad.

PRECAUCIONES

Debe evitarse la utilización prolongada del tratamiento y respetar el cuadro posológico.

Embarazo y Lactancia: No se encuentra disponible información específica acerca del uso de INESPECIN durante el embarazo, por lo tanto, se recomienda evaluar en cada caso particular, la necesidad de uso de

INESPECIN durante el embarazo.

Pediatría: Utilizar la dosis indicada en Posología. Por tratarse de un comprimido, tener la precaución de que el niño no tenga dificultades de ingerirlo.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS

No se conocen.

Administración conjunta con vacunas: Se desconocen datos acerca de la administración simultánea con vacunas.

REACCIONES ADVERSAS

INESPECIN es bien tolerado. Ocasionalmente se han reportado casos de aumento de la temperatura, no conociéndose otras reacciones adversas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694

Hospital de Pediatría Pedro Elizalde: (011) 4300 2115

Hospital A. Posadas: 0800 333 0160

Hospital Fernández: (011) 4808 2655

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 6 comprimidos.

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente por debajo de 30°C.

Utilizar este medicamento antes de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 32.219 – Argentina

Dirección Técnica: Lic. Anabela M. Martínez - Farmacéutica

Última revisión: Septiembre 1998

ME186 - V01



INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.

Administración: Pte. José E. Uriburu 153 C1027AAC

C.A.B.A. – Tel.: (00 54 11) 4953-7215 – Email: biol@biol.com.ar

Planta Industrial: Calle 606 Dr. Silvio Dessy 351

B1867DWE - Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires

Tel.: (00 54 11) 4255-1040 – Email: planta@biol.com.ar