

VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE "BIOL" Inyectable

Industria Argentina

Venta bajo receta

Cada ampolla de 1 ml contiene:

(*) Staphylococcus aureus	500	millones
Streptococcus pyogenes, beta hemolitico.....	250	millones
Streptococcus anhemolítico.....	200	millones
Streptococcus pneumoniae tipo I.....	100	millones
Streptococcus pneumoniae tipo II.....	100	millones
Streptococcus pneumoniae tipo III.....	100	millones
Pseudomona aeruginosa.....	250	millones
Escherichia coli.....	250	millones
Micrococcus roseus.....	250	millones
Fenol.....	5	mg.
Cloruro de Sodio.....		8,5 mg
Agua destilada c.s.p.....	1	ml
(*) Clasificación según manual Bergey De. 1975.		

ACCION TERAPEUTICA:

Inmunización activa contra microorganismos responsables de infecciones bacterianas de vías respiratorias e infecciones localizadas recidivantes.

INDICACIONES:

Profilaxis de infecciones bacterianas de vías aéreas (rinofaringitis, rinitis, laringitis, sinusitis y broncopatías crónicas) e infecciones localizadas recidivantes (mastitis, forunculosis, piodermitis).

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS - PROPIEDADES:

Vacuna Antiopiógena BIOL es una vacuna inactivada conteniendo una suspensión de Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes beta hemolitico y anhemolítico, Streptococcus pneumoniae tipo I, II y III, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Micrococcus roseus. En el organismo, el contacto de antígenos de superficie bacteriana de dichos microorganismos, producen la diferenciación y maduración de linfocitos inmunocompetentes que son estimulados de manera específica.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:

Esquema de administración en adultos:

Administración: Subcutánea o Intramuscular.

Duración del tratamiento: 5 semanas. Se realizan 2 aplicaciones semanales en intervalos de 2 a 4 días.

Comenzar aplicando 0,25 ml por vía IM o subcutánea, aumentando progresivamente la dosis hasta la aplicación de una ampolla completa.

Esquema de administración en niños, adultos sensibles y tratamientos desensibilizantes:

Comenzar aplicando dosis menores e ir aumentando progresivamente la dosis según sensibilidad debiendo ajustarse el esquema posológico según criterio médico.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna. No administrar en niños o adultos con enfermedades agudas, infecciones o estados febriles.

ADVERTENCIAS

Pacientes que tienen disminuida la respuesta inmunitaria tales como los sometidos a terapias inmunosupresivas (incluyendo irradiación, corticosteroides, antimetabolitos, agentes alquilantes y citotóxicos), con defectos genéticos, infección por HIV u otras causas, pueden tener una reducida respuesta a la inmunización.

PRECAUCIONES

Generales:

- 1) Previo a la administración de Vacuna Antipiógena BIOL, se debe consultar al paciente de la historia personal y familiar, y el estado de salud reciente del paciente a ser inmunizado, con motivo de determinar la existencia de alguna contraindicación para la inmunización con Vacuna Antipiógena BIOL.
- 2) En el momento de retornar para la siguiente dosis, se debe preguntar al paciente acerca de la aparición de algún síntoma o signo de alguna reacción adversa luego de la dosis previa.
- 3) Antes de la inyección de cualquier biológico, el médico debe tomar todas las precauciones conocidas para la prevención de alergia o algún otra reacción adversa: Esto debe incluir: revisión de la historia del paciente relacionada con posible sensibilidad; la disponibilidad de epinefrina 1:1000 y otros agentes apropiados usados para controlar inmediatamente reacciones adversas.
- 4) Para cada dosis individual se deben usar jeringas y agujas estériles separadas, para prevenir la transmisión de hepatitis y otros agentes infecciosos de una persona a otra.
- 5) En niños y adultos sensibles, y en tratamientos desensibilizantes, las dosis son menores y deben ajustarse a cada caso.

Embarazo: No se encuentra disponible información específica acerca del uso de Vacuna Antipiógena BIOL durante el embarazo. Sin embargo, como en el caso de otras vacunas bacterianas inactivadas, su uso no está contraindicado a menos que la paciente haya manifestado reacciones sistémicas o alérgicas luego de la administración de una dosis.

Se recomienda evaluar en cada caso particular, la necesidad de uso de Vacuna Antipiógena BIOL durante el embarazo.

Lactancia: Se desconoce si Vacuna Antipiógena BIOL es excretada en la leche humana.

Uso Pediátrico: La disminución de la dosis queda a criterio médico.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS

En caso de estar recibiendo alguna otra droga medicación, consulte a su médico del beneficio de una terapia conjunta.

Otras vacunas: Se desconocen datos acerca de la administración conjunta con otras vacunas.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones secundarias dependen de la sensibilidad del paciente a los componentes microbianos de la Vacuna. Las reacciones locales, si se observan, aparecen casi siempre a las 24 horas de la aplicación en forma de inflamación o tumefacción dolorosa y no son siempre apreciables. Las reacciones sistémicas pueden manifestarse como un ligero malestar con pequeñas elevaciones térmicas y son poco frecuentes.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (01) 962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (01)654-6648/658-7777

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRESENTACION:

Caja conteniendo 2, 10 y 100 amp. de 1 ml., este último Envase Hospitalario.

Conserve este medicamento entre +2 y +8°. NO CONGELAR - AGITESE ANTES DE USAR

Utilizar este medicamento antes de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N° 16.543

Directora Técnica: Dra. Anabela Marisa Martínez – Farmacéutica

Última revisión: Septiembre 1998.

INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.

Dirección y Administración: Pte. J. E. Uriburu 153 C1027AAC Capital Federal

Tel: 4953-7215

Laboratorios: Calle 606 Dr. Dessy 351 B1867DWE Fcio Varela, Pcia. de Bs As.

